

Kikhosta

Kikhosta orsakas av bakterier och sprids som droppsmitta när man hostar. Smittsamheten är hög. Sjukdomen börjar i typiska fall som en förkylning med hosta och eventuellt lätt feber. Hostan tilltar, börjar komma mer attackvis och blir efterhand allt intensivare. Barn kan efter några veckor i anslutning till hostattackerna, även få svårt att andas (kikningar). Attackerna avslutas ofta med att barnet hostar/kräks upp slem. Sjukdomen brukar ha gått över efter ungefär sex veckor. Vuxna och vaccinerade barn får ofta lindrigare symtom men kan ändå vara smittsamma.

Eftersom immuniteten efter genomgången kikhosta eller vaccination inte är livslång, kan man få sjukdomen även i vuxen ålder. Barn med kikhosta kan delta i barngrupper om det orkar med aktiviteterna. Man måste räkna med att smittspridning redan skett och att en avstängning hjälper föga.

Barn under ett års ålder kan bli svårt sjuka i kikhosta. Spädbarn yngre än sex månader, som utsatts för kikhosta, bör därför ges antibiotika i förebyggande syfte. Är barnet 6-12 månader ges antibiotika vid symtom. Äldre barn som fått kikhosta och som har småsyskon under ett år, bör likaså antibiotikabehandlas för att därigenom minska risken för spridning av smittan.

Kontakta din vårdcentral om du tror att ditt barn kan vara smittat av kikhosta.

| | | | |
|---------------------|----------------------|--------------|--|
| <u>Postadress</u> | <u>Telefon</u> | | <u>Telefax</u> |
| Falu lasarett | Smittskyddsläkare | 023-49 23 26 | 023-49 07 72 |
| Smittskydds-enheten | Smittskyddssköterska | 023-49 07 84 | <u>E-post</u> |
| 791 82 FALUN | Smittskyddssköterska | 023-49 02 73 | smittskydd.dalarna@ltdalarna.se |
| | | | <u>Hemsida</u> |
| | | | www.ltdalarna.se/smittskydd |